

神經刺激治療科

(Neurostimulation Program)

地址：805 West 12th. Avenue Vancouver, B.C.

V5Z 1M9

6th Floor Willow Pavilion

電話：604-675-2449

電痙攣治療法

離院指示

你的醫生建議使用電痙攣治療法，作為治療方案的一部分。我們樂意參與其中，讓你全面獲得醫療護理。當你每次接受治療後，本科門診部讓你回家休息，但我們希望你在家既安全又舒適。若你在接受電痙攣治療法後感到不適，這份簡介可以幫助你或照顧你的人，決定怎樣做。

如果你曾經接受全身麻醉，並且產生治療性的痙攣（抽搐），則我們強烈建議你在離院後最初24小時，要注意以下各點：

- 舒適地休息，並且由成人負責照顧你，例如：家人、朋友或護理機構的人員。
- **除了以下兩項之外**，可恢復一般日常活動：
 - 避免飲酒
 - 不要駕駛車輛

你可能出現輕微的副作用。他們通常可能在數小時後消退。如果你有輕微的副作用，請與本科職員或家庭



醫生商討，這些副作用包括(但不限於)以下徵狀：

- 輕微頭痛
- 身體有輕微疼痛
- 胃部不適
- 輕微精神紊亂或善忘

一些身體不適，未必與你接受電痙攣治療法有關，但你可能需要較急切求醫，它們包括(但不限於)以下徵狀：

- 呼吸困難
- 胸痛
- 肩膀或手臂疼痛
- 腹部劇痛
- 頭部劇痛
- 昏眩
- 突然感到虛弱乏力或麻痺
- 突然在說話或理解言語方面有困難
- 口部、頷部或牙齒劇痛

如果身體不適，需要急切求助，請致電911或前往最近的醫院急症部求醫。

如果你有任何問題或關注事情，亦可以在星期一至五，致電溫哥華綜合醫院辦事處，電話：**604-675-2449**或**604-675-2476**。